



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES

PREFEITURA

DIA D CONTRA A FEBRE AMARELA REALIZADO COM SUCESSO EM GUAÇUÍ

Publicado em 23/01/2017 às 17:05 (Atualizado em 13/04/2024 às 05:56), postado por , Fonte:

5.424 doses da vacina foram aplicadas em todo município neste sábado (21).
Texto: Prefeitura de Guaçuí/Nelsinho Salvador Foto: Prefeitura de Guaçuí/Leo Ola
Nos últimos dias os municípios do Caparaó têm estado em situação de alerta, quando o assunto é febre amarela, depois que cerca de 80 macacos foram encontrados mortos em municípios de Minas Gerais que fazem divisa com o estado. A secretaria de estado da saúde disponibilizou junto ao ministério da saúde 350 mil doses da vacina que estão sendo distribuídas para 26 municípios do Espírito Santo, segundo informações da secretaria de estado da saúde a vacina é para cautelar, uma medida preventiva, uma vez que não há confirmação da doença no estado. Em Guaçuí as vacinas começaram neste sábado (21) sendo o dia D contra a febre amarela, todas as unidades de saúde estiveram abertas a população das 8:00h às 16:00h e 5.424 doses da vacina foram aplicadas, quem ainda não se imunizou deve ir até o ponto de atendimento mais próximos da sua casa a partir desta terça-feira (24), com a cardeneta de vacinação em mãos. O atendimento foi prioritário na área de maior risco e foram aplicadas 1186 doses da vacina nos três distritos do município São Pedro de Rates, Assentamento Talliuly Neto e São Thiago, que formam a zona rural do município, pois os casos em suspeita no estado são de febre amarela silvestre onde o mosquito transmissor não é o mesmo da zona urbana, e também pelo fato da região ser formada por uma mata contínua, sem barreiras com o Estado de Minas Gerais. Segundo o secretário de saúde Anselmo Dantas "Haverá dosagem para toda população, não há necessidade de preocupação da quanto a isso, todos postos de saúde estão fazendo o atendimento".

INDICAÇÃO

ESQUEMA

Crianças de 6 meses a 9 meses de idade incompletos A vacina está indicada somente em situações de emergência epidemiológica, vigência de surtos, epidemias ou viagem inadivél para área de risco de contrair a doença.

Crianças de 9 meses até 4 anos 11 meses e 29 dias de idade

Administrar 1 dose aos 9 meses de idade e 1 dose de reforço aos 4 anos de idade, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

Pessoas a partir de 5 anos de idade, que receberam uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade Administrar uma única dose de reforço, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

Pessoas a partir de 5 anos de idade, que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação Administrar a primeira dose da vacina e, 10 anos depois, 1 dose de reforço.

Pessoas a partir dos 5 anos de idade que receberam 2 doses da vacina Considerar vacinado. Não administrar nenhuma dose.

Pessoas com 60 anos e mais, que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES

vacina??o O m?dico dever? avaliar o benef?cio e o risco da vacina??o, levando em conta o risco da doen?a e o risco de eventos adversos nessa faixa et?ria ou decorrentes de comorbidades.

Gestantes, independentemente do estado vacinal A vacina??o est? contraindicada. Na impossibilidade de adiar a vacina??o, como em situa?es de emerg?ncia epidemiol?gica, vig?ncia de surtos, epidemias ou viagem para ?rea de risco de contrair a doen?a, o m?dico dever? avaliar o benef?cio e o risco da vacina??o.

Mulheres que estejam amamentando crian?as com at? 6 meses de idade, independentemente do estado vacinal A vacina??o n?o est? indicada, devendo ser adiada at? a crian?a completar 6 meses de idade. Na impossibilidade de adiar a vacina??o, como em situa?es de emerg?ncia epidemiol?gica, vig?ncia de surtos, epidemias ou viagem para ?rea de risco de contrair a doen?a, o m?dico dever? avaliar o benef?cio e o risco da vacina??o. Em caso de mulheres que estejam amamentando e receberam a vacina, o aleitamento materno deve ser suspenso preferencialmente por 28 dias ap?s a vacina??o (com um m?nimo de 15 dias).

Viajantes Viagens internacionais: seguir as recomenda?es do Regulamento Sanit?rio Internacional (RSI).

Viagens para ?reas com recomenda??o de vacina no Brasil: vacinar, pelo menos 10 dias da viagem, no caso de primeira vacina??o. O prazo de 10 dias n?o se aplica no caso de revacina??o.

Contraindica?es: - Crian?as menores de 6 meses de idade; - Pacientes com imunodepress?o de qualquer natureza; - Pacientes infectados pelo HIV com imunossupress?o grave; - Pacientes em tratamento com drogas imunossupressoras (corticosteroides, quimioterapia, radioterapia, imunomoduladores); - Pacientes submetidos a transplante de ?rgos; - Pacientes com imunodefici?ncia prim?ria; - Pacientes com neoplasia; - Indiv?duos com hist?ria de rea??o anafil?tica relacionada a subst?ncias presentes na vacina (ovo de galinha e seus derivados, gelatina bovina ou outras); - Pacientes com hist?ria pregressa de doen?as do timo (miastenia gravis, timoma, casos de aus?ncia de timo ou remo??o cir?rgica); - A administra??o deve ser analisada caso a caso na vig?ncia de surtos. ?

Informa?es para a imprensa Superintend?ncia de Imprensa Oficial comunicacao@guacui.es.gov.br www.guacui.es.gov.br
www.facebook.com.br/prefeituradeguacui www.youtube.com/prefeituradeguacui
www.twitter.com/guacui_gov (28) 3553-3389 ? ? ? *Os textos produzidos pela assessoria de comunica??o da prefeitura de Gua?u? podem ser reproduzidos gratuitamente, apenas para fins jornal?sticos, mediante a cita??o da fonte: Assessoria de Comunica??o/ Prefeitura de Gua?u?.



AUTENTICA??O

8baf7e02de512bea86ad9df1b95422df

<https://guacui.es.gov.br/noticia/2017/01/dia-d-contra-a-febre-amarela-realizado-com-sucesso-em-guacui-out.html>